

PÔSTER DIGITAL

Outros temas relacionados à Atenção Primária e Medicina de Família e Comunidade

Influência da síndrome dos ovários policísticos no risco cardiovascular: uma revisão bibliográfica

Fernanda Machado dos Santos. ESF Centro Rural Piraju-SP. fernanddamachado@hotmail.com

Ricardo Augusto Fernandes. ESF Centro Rural Piraju-SP. drricardofernandes@yahoo.com.br

Rafaela Moreno Ramos Gonçalves. ESF Centro Rural Piraju-SP. rafinhapiraju@gmail.com

Introdução: Descrita inicialmente por Stein e Leventhal em 1935, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma desordem endócrina metabólica heterogênea, que acomete mais de 7% das mulheres. A SOP doença endocrinometabólica que leva maior propensão à obesidade central e Acantose Nigrans, que indica a resistência insulínica e ocasiona maior chance de desenvolver Diabetes Mellitus elevando o risco cardiovascular.

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo determinar a associação do risco cardiovascular das mulheres com SOP, devido ser uma patologia freqüente na idade fértil.

Metodologia ou descrição da experiência: Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, realizada por meio de revisão bibliográfica de literatura. Utilizou artigos publicados no período compreendido entre 2006 e 2012 nos idiomas português e inglês, nas bases de dados do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (BIREME), do United State National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED) e Livro de Endocrinologia. Descritores utilizados serão: síndrome dos ovários policísticos, risco cardiovascular e resistência insulínica.

Resultados: A revisão sistemática realizada utilizando os descritores de saúde obteve 63 referências na BIREME, com 18 artigos completos, nos últimos 5 anos, sendo selecionados 6 artigos relacionados ao tema. Enquanto, no PUBMED, encontramos 726 referências, com 103 artigos completos nos últimos cinco anos onde foram selecionados 6 artigos relacionados ao tema.

Conclusões ou hipóteses: Os estudos descritos demonstram que há uma associação significativa no aumento do risco cardiovascular em mulheres com SOP, tanto pelas alterações endocrinometabólicas características da doença, pela modificações que a patologia determina no organismo como a resistência insulínica e a obesidade central.

Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos. Risco Cardiovascular. Resistência Insulinica.